OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR
(Prix du présent fascicule : 4 francs)

72,896

MÉLANGES EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

VINGT-QUATRIÈME FASCICULE

(20 juin 1917)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS
IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE
ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1917

Tous droits réservés

LIBRARY
MUS. COMP. ZOÖLOGY,
CAMBRIDGE, MASS.

INTRODUCTION

Quelques réflexions à propos de l'impression ne seront pas de trop aujourd'hui.

Certains auteurs attachent une importance capitale à une impression soignée, s'efforcent de l'obtenir toujours très régulière ou uniforme ; d'autres même poussent l'amour de l'art jusqu'à juger de la valeur d'un ouvrage suivant l'impeccabilité de son impression, ou même d'après l'élégance de la couverture. Parfois la beauté du papier influe sérieusement sur le jugement des critiques.

Le coup d'œil n'est pas à dédaigner et je conviens qu'il est plus agréable de travailler avec un volume bien imprimé, de parcourir un journal nettement lisible, que de travailler sur un texte embrouillé (ou un manuscrit illisible), mais il ne faut pas pousser à l'extrême cet amour du parfait jusqu'à demander un moule unique, une conception uniforme (qui, à la longue, tournerait à la monotonie) pour tout ce que produit un auteur.

Si un auteur publie un nouveau genre en mettant après lui tantôt n. gen., tantôt n. g., ou encore nov. genus ou nouv. genre, il ne faut pas le blâmer ; il ne convient pas non plus de critiquer, s'il fait imprimer ces mots en caractères différents (tantôt en normandes, tantôt en italiques, voire en romaines).

En résumé, l'important est qu'un auteur se fasse bien comprendre ; celui-ci ne mérite réellement d'être critiqué que si son texte prête à équivoque, ou contient des coquilles *kolossales*.

Cela dit, pour servir d'instruction à l'occasion à ceux qui peuvent en avoir besoin, je vais aborder la partie descriptive et redire, au risque de devenir monotone, que tous les *types* figurent dans ma collection.

DESCRIPTIONS ABRÉGEES DIVERSES

Silisoptinus n.gen. Antennis validibus et elongatis, thorace peculiare, lateraliter denticulato et lobato, supra postice impresso, in disco sat tuberculato et excavato, postice sinuato ; elytris latis, ad basin carinatis et deplanatis, apice valde marginatis : pedibus satis elongatis. — Se rapproche du s.-g. *Diegous* Pic et très caractérisé par la particulière structure du prothorax dont un des plus curieux caractères est la présence de plusieurs denticules latéraux et d'un lobe postérieur denté analogue à celui des *Silis* Latr. ♂.

Silisoptinus singularicollis n. sp. Robustus, parum nitidus, rufescens, thorace lateraliter postice, scutello, infra corpore pedibusque dense albo pubescentibus aut squamulatis ; elytris ad et post medium luteo multimaculatis et ad apicem albo-luteo maculatis, his fortiter punctato-crenulatis, intervallis angustatis ; thorace satis elongato, valde inæquale, in disco sulcato, gibboso et impresso, lateraliter denticulato et lobato, postice sinuato et marginato. Long. 3,5 mill. Zanzibar.

Ptinus (Eutaphrus) æthiopicus v. nov. subelongatus. Parum latus, elytris rufis, lateraliter in medio distincte nigro notatis, thorace in medio mediocre griseo fasciculato. Abyssinie (Raffray). — Moins large que *æthiopicus* Ancey avec le prothorax peu fasciculé et orné de poils grisâtres.

Ptilinus laticollis n. sp. Elongatus, rufescens, subparallelus, subopacus, sat dense griseo-pubescens, antennis, pedibus, elytris et infra corpore pallidioribus, oculis magnis. Thorace transverso, lateraliter fere recto, postice

biimpresso, in disco minute depresso ; elytris elongatis, minutissime et dense punctulatis. Long. 5 mill. Abyssinie (Raffray) — Distinct de *P. senegalensis* Pic, par l'écusson plus foncé et plus allongé, l'avant-corps plus robuste, etc.

Clada abyssinica n. sp. Oblongus, mediocre pubescens, nitidus, rufescens. Capite antice subarcuato inciso ; thorace lateraliter subarcuato, in disco postice et lateraliter valde depresso ; elytris lineato-punctatis, in disco subcostulatis. Long. 6 mill. Abyssinie (Raffray). — A placer près de *C. antennata* Pic et distinct, à première vue, par la coloration uniforme et les élytres à ponctuation plus nette.

Scaphidium Donckieri n. sp. Nitidus, niger, antennis ad basin et apice tarsisque pro parte rufescentibus. Thorace lateraliter marginato, ad basin arcuato punctato ; elytris subovatis, ad suturam valde sulcatis, in disco irregulariter et sparse lineato-punctatis. Long. 4 mill. Madagascar : Fort Carnot (ex. Donkier). — Voisin de *S. politum* Frm., mais abdomen entièrement foncé et coloration des pattes différente.

Scaphidium pygidiale n. sp. Nitidus, niger, capite, thorace, antennis ad basin, pedibus, abdomine pygidioque rufis. Thorace lateraliter marginato, ad basin arcuato punctato ; elytris nigris, apice rufo marginatis. Variat : thorace in disco postice nigro notato, abdomineque ad basin nigro (v. nov. **bicoloricolle**). Long. 5 mill. Madagascar. — Très voisin du précédent, coloration différente, stries présuturales moins profondes, etc.

Silidius subviolacea n. sp. Elongatus, nitidus, parum distincte pubescens, niger, elytris subviolaceis. Antennis filiformibus ; thorace transverso, antice subarcuato, lateraliter postice subangulato, in disco mediocre impresso ; elytris elongatis, subparallelis, dense rugulosis. Long. 7 mill. Madagascar : Fort Carnot. — Très voisin

de *S. obscurithorax* Pic, prothorax différent, moins impressionné et élytres plus foncés, à reflets violacés.

Silidius Carnoti n. sp. Satis elongatus, fere opacus, breve pubescens, niger, thorace testaceo, in disco nigro-lineato (vitta bisinuata et antice dilatata) et lateraliter medio nigro maculato. Antennis gracilibus ; thorace satis breve, lateraliter subarcuato, postice minute inciso, in disco et lateraliter impresso ; elytris satis latis, subparallelis, dense rugulosis, in disco antice bicostulatis. Long. 11 mill. Fort Carnot. — Paraît différer de *S. mandibularis* Frm. par les dessins noirs du prothorax différents et la forme moins allongée.

Cantharis (1) **lineatofemoralis** n. sp. Satis elongatus, pro parte nitidus, pallido-testaceus, capite postice, thorace in medio late, femoribus supra, tibiis lateraliter nigro-virescentibus, abdomine minute nigro maculato, antennis nigris, ad basin et infra testaceo notatis, elytris viridi-metallicis, rugulosis, fere opacis. Long. 16-17 mill. Bengale. — Très voisin de *C. leechiana* Gorh, macule prothoracique plus grosse, antennes en majeure partie noires et pattes autrement marquées de foncé.

Cantharis semistrangulata n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, pallido-testaceus, capite pro majore parte, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris, elytris viridi-metallicis. Long. 18 mill. Indes. — Espèce très distincte par son prothorax concolore clair, joint à sa forme élytrale fortement rétrécie et presque étranglée après le milieu. Peut se placer près du précédent.

Cantharis inimpressipennis n. sp. Satis elongatus, nitidus, postice minute attenuatus, testaceus, femoribus apice, tibiis tarsisque nigris ; elytris cæruleo-metallicis. Long. 17 mill. Cambodge. — Voisin de *C. rugosocya-*

(1) Le nom de *indica* Pic (1916) est à changer en **indiana, à cause de *Cantharis indica* Pic (1906).**

neus Frm., mais élytres sans trace d'impression suturale, antennes plus claires et prothorax droit sur les côtés.

Cantharis taliana n. sp. Parum elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, pallido-testaceus, oculis tarsisque nigris, elytris cyaneo-metallicis, ad basin fere lævibus et nitidis. Long. 17 mill. Chine Méridionale : Tali. — Plus rétréci en arrière que le précédent avec le prothorax plus large, la base des élytres plus brillante et la majeure partie des pattes testacée.

Cantharis M-notata n. sp. Elongatus, postice, attenuatus, nitidus, niger, antennis ad basin, infra femoribusque ad basin rufis, thorace pallido, postice nigro maculato (macula transversa, sinuata), infra corpore pallido, nigro multimaculato. Long. 14 mill. Indes. — Espèce très distincte par le prothorax orné d'une macule foncée, sinuée en forme d'M et par sa poitrine en partie pâle, en partie foncée. Peut se placer près de *C. basicrus* Frm.

Cantharis mimilycus n. sp. Elongatus, opacus, pubescens, niger, elytris rufis, ad basin late nigris. Antennis validis, depressis, apice valde attenuatis ; thorace breve, antice attenuato ; elytris thorace paulo latioribus, ad medium dilatatis et postice parum strangulatis, in disco costatis. Long. 12 mill. Equateur. — Jolie espèce, mimant un Lycide, et très distincte par sa coloration peut se placer près de *C. convergens* Bourg.

Cantharis subopacicollis n. sp. Elongatus, opacus, pubescens, niger, elytris luteis, apice sat breve et in disco ad medium nigro notatis : Antennis validis, depressis, apice attenuatis ; thorace subquadrato, nigro, antice minute rufo marginato ; elytris thorace paulo latioribus, ad medium dilatatis et postice parum attenuatis, in disco costatis. Long. 10 mill. Colombie : Bogota. — Voisin du précédent, antennes moins atténuées à l'extrémité, prothorax plus robuste et coloration bien différente.

Discodon caucaense n. sp. ♀. Elongatus, subparallelus, parum nitidus, niger, capite antice thoraceque flavis, pedibus pro parte rufescentibus ; thorace transverso, antice arcuato, postice lateraliter sinuato et minute inciso ; elytris thorace indistincte latioribus, post medium minute dilatatis, apice subrotundatis, pro parte rugulosis. Long. 9 mill. Colombie : Cauça. — Voisin de *D. plicatum* Gorh. et distinct, à première vue, par le prothorax entièrement flave.

Chauliognathus trifossicollis n. sp. Elongatus, postice dilatatus, fere opacus, rubro-testaceus, oculis elytrisque nigris. Capite parum elongato ; thorace breve, antice valde attenuato, lateraliter subsinuato, in disco fortiter impresso ; elytris latis, postice dilatatis, apice subrotundatis, pro parte rugulosis. Long 16 mill. Bolivie. — Jolie espèce à structure du prothorax particulière, cet organe offrant postérieurement trois larges impressions en forme de fossettes.

Chauliognathus brunneonotaticeps n. sp. Elongatus, subparallelus, fere opacus, testaceus, infra corpore proparte elytrisque nigris ; capite inter oculos brunnescente, elongato ; thorace transverso, antice arcuato, lateraliter fere recto ; elytris thorace parum latioribus, lateraliter sinuatis, rugulosis. Long 9 mill. Guyane française. — Peut se placer, provisoirement, près de *C. Haversi* Wat., moins grand, élytres concolores et prothorax différent.

Xylotrechus biarcuatus n. sp., Elongatus, niger, dense luteo pubescens, signaturis nigris ornatus, labro, antennis pedibusque testaceis, femoribus nigro notatis, elytris ad scutellum et infra humeros rufo notatis. Capite unicarinato ; antennis satis brevibus ; thorace elongato, in disco nigro lineato, lateraliter et ad medium nigro bimaculato ; elytris apice sinuatis et externe dentatis, humeris rotundatis, signaturis nigris ornatis : macula humeralis arcuata, macula rotundata interna, fascia antica

postice valde curvata, fascia transversa post medium subarcuata et fascia postice reducta subarcuata, longe ante apicem sita, elytris lateraliter breve nigro cinctis ; pedibus elongatis. Long: 15 mill. Chine : Yunnan. Peut se placer près de *X. Gestroi* Gahan, dessins du prothorax et des élytres différents, formés d'une ligne longitudinale noire flanquée, de chaque côté, d'un point noir médian avec en outre, de chaque côté, une 2e macule externe, prothorax moins robuste, etc.

Xylotrechus atrolineatus n. sp. Elongatus, niger, dense luteo pubescens, signaturis nigris ornatus, labro, antennis pedibusque testaceis. Capite unicarinato ; antennis satis brevibus ; thorace elongato, nigro lineato, lateraliter et ad medium nigro bimaculato ; elytris apice sinuatis et externe dentatis, antice et postice in singulo quadri maculatis, ante et post medium nigro fasciatis, pro parte rufo cinctis ; pedibus elongatis. Long. 16 mill. Indes : Khisi Hills. — Très voisin du précédent, mais cuisses entièrement testacées, antennes moins courtes et dessins noirs des élytres un peu différents, la première fascie se rejoignant en avant sur la suture, et les dessins postérieurs noirs sont représentés par deux macules juxtaposées (au lieu de former une fascie assez large, subarquée).

Clytus rufoapicalis n. sp. Elongatus, subparallelus, opacus, niger, antennis pedibusque pro parte picescentibus, minute griseo pubescens, elytris apice breve rufotestaceo maculatis, antice et postice albo fasciatis. Antennis elongatis ; thorace elongato, pro parte granuloso ; scutello magno ; elytris antice arcuate, postice transverse, albo fasciatis (fascia prima ad scutellum remota) ; pedibus elongatis. Long. 12 mill. Thibet. — Voisin de *C. fuliginosus* Frm. distinct, à première vue, par la forme plus allongée et les élytres maculés de roux-testacé au sommet.

Aprona submaculosa n. sp. Parum elongatus, subni-

tidus, niger, elytris brunnescentibus, supra minute griseo pubescens et luteo fulvo maculatus, infra pro parte minute griseo pubescens, pro parte dense albo pubescens. Articulo 1° antennarum dilatato et breve ; capite sulcato ; thorace breve, in disco parum et irregulariter plicato, aut tuberculato, antice et postice transverse sulcato et luteo fulvo maculato ; scutello valido, truncato, postice impresso, luteo-fulvo maculato ; elytris latis, sat elongatis, postice attenuatis et apice ad suturam spinosis, sparse punctatis, ad basin mediocre granulatis, humeris prominulis, disperso et irregulariter luteo-fulvo maculatis ; pedibus validis. Long. 48 mill. Tonkin : Hanoï. — Cette espèce, bien distincte par son revêtement, peut se placer près de *A. basicornis* Frm.

Kuilua brevior n. sp. Modice elongatus, parum nitidus, pubescens, supra testaceus et nigro notatus, infra corpore, antennis pedibusque piceis. Capite satis elongato, pro parte testaceo, pro parte nigro ; thorace breve, lateraliter transverse sulcato, postice subtuberculato, antice et postice lateraliter impresso et sulcato, testaceo, in disco vitta nigra interrupta ornato ; scutello nigro ; elytris thorace distincte latioribus, parallelis, apice subattenuatis, deplanatis, lateraliter carinatis, fortiter et dense punctatis, testaceis, apice sat late nigro notatis, sutura pro parte nigra ; pedibus validis, pilosis, tibiis paulo arcuatis. Long. 9 mill. Congo : Sangha. — De forme moins allongée que *K. africana* Jac., et intermédiaire entre cette espèce et *K. ochraceipennis* Pic.

Colobapsis notatithorax v. nov. innotaticollis. Thorace rufo, immaculato ; elytris rufis, ad humeros et ad medium in disco nigro notatis. Gabon : Ogoué. — La forme type présente une macule noire sur le disque du prothorax.

Pæcilomorpha testaceipennis n. sp. Oblongus, parum nitidus, pubescens, rufo-testaceus, oculis antennisque apice nigris, tarsis posticis brunnescentibus. Capite thoraceque minute sat sparse punctatis ; oculis magnis ;

thorace breve, lateraliter sat dilatato, antice posticeque attenuato et transverse sulcato ; elytris satis brevibus ; pedibus posticis validis, tibiis arcuatis. Long. 7 mill. Côte d'Ivoire. — Très voisin de *P. testaceipes* Pic, mais élytres de coloration uniforme plus pâle, prothorax plus distinctement ponctué, etc.

Mastosthethus pallidofasciatus n. sp. Latus nitidus, tere glaber, niger, elytris ante et post medium pallido et undulato bifasciatis. Thorace breve, antice attenuato, minute et sparse punctato ; elytris brevibus, lateraliter sinuatis, sat fortiter et sparse punctatis ; tibiis intermediis et posticis valde arcuatis. Long. 12 mill. Pérou. — Voisin de *M. 4-notatus* Er., mais dessins des élytres différents, fasciés. Par sa coloration se rapproche de *M. atrofasciatus* Blanch., mais les fascies claires sont plus régulières, peu ondulées et la 2e est très rétrécie vers la suture.

Pedrilliomorpha n. gen. Oculis prominulis, integris ; antennis validis, elongatis, articuli 3° elongato, 4° longissimo ; thorace breve, lateraliter tuberculato, postice inciso, ad basin sinuato et postice minute sulcatulo ; elytris elongatis ; pedibus robustis, tarsis dilatatis, unguiculis separatis, coxis anticis parum distantibus. — Genre intermédiaire entre *Pedrillia* Westw. et *Zeugophora* Kunze, distinct, à première vue, par la structure de son prothorax et par sa forme plus allongée.

Pedrilliomorpha atrosuturalis n. sp. Elongatus, subparallelus, parum nitidus et sparse pubescens, niger, capite thoraceque postice rufo notatis, elytris testaceis, ad suturam, apice excepto, nigro marginatis, fortiter sat dense punctatis ; thorace dense punctato. Long. 7 mill. Indes : Sikkim.

Zeugophora unifasciata n. sp. Satis latus, nitidus, pallido-testaceus, oculis, infra corpore, femoribus posticis scutelloque nigris, elytris nigro-subcæruleis, ad

medium transverse pallido fasciatis. Long. 5 mill. Indes : Sikkim. — Voisin de *Z. indica* Jac. et distinct, à première vue, ainsi que des autres espèces du genre, par ses élytres unifasciés de clair.

Cryptocephalus pallidoapicalis n. sp. Elongatus, minutus, niger, capite, thorace, scutello, antennis pedibusque pallido-testaceis. Thorace breve, pro parte et multi brunnescente maculato ; elytris elongatis, substriatis, lineato-punctatis. Long. 3-3,5 mill. Chine ; Yunnan. — Voisin de *C. petulans* W. et distinct, à première vue, par sa macule apicale pâle.

Cryptocephalus yunnanus n. sp. Minutus, satis robustus, nitidus, niger, elytris subcyaneis, capite pro parte et pedibus anticis plus minusve rufo-notatis, thorace rufo-testaceo, in disco postice nigro maculato. Thorace breve ; elytris satis brevibus, substriatis, fortiter lineato punctatis. Long. 2,5-3 mill. Chine : Yunnan. — Moins allongé et autrement coloré que le précédent. Par sa coloration rappelle *C. discoderus* Frm., mais plus petit avec les pattes plus foncées.

Cryptocephalus thibetanus n. sp. Minutus, robustus, nitidus, testaceus, oculis et infra corpore nigris, elytris viridescentibus. Thorace breve ; elytris latis et brevibus, mediocre lineato punctatis. Long 3 mill. Thibet. — Un peu plus trapu que le précédent et très distinct, à première vue, par son prothorax entièrement testacé.

Cryptocephalus saigonensis n. sp. Robustus, minutus, postice attenuatus, nitidus, niger, capite pro parte, antennis ad basin, thorace (illo antice nigro bimaculato), infra corpore lateraliter pedibusque testaceis, elytris nigris, lateraliter antice breve rufo-testaceo notatis. Thorace satis breve ; elytris fortiter lineato-punctatis. Long. 3 mill. Saïgon. — Distinct des précédents par sa forme, par ses élytres plus atténués postérieurement et plus fortement, ou plus régulièrement, ponctués.

Cryptocephalus triangularis v. nov. postunifasciatus. Robustus, niger, capite in medio, thorace antice et lateraliter testaceo notatis, elytris nigris, ad basin breve et ante apicem transverse pallido-testaceo fasciatis, Kashmir. — Variété très distincte par sa particulière coloration élytrale.

Cryptocephalus triangularis v. nov. bifurcatus. Robustus, niger, capite medio testaceo notato, antennis ad basin rufescentibus. Kashmir. — La coloration testacée forme sur la tête une bande longitudinale fourchue à ses deux extrémités.

Cryptocephalus robustissimus n. sp. Robustus, latus, nitidus, infra mediocre pubescens, testaceus, antennis pro majore parte, oculis, scutello, infra corpore (abdomine apice pygidioque testaceis) nigris, elytris ad humeros nigro maculatis. Antennis filiformibus ; thorace breve, postice impresso, lobo prominulo ; elytris latis et brevibus, minute, pro parte lineato punctatis. Long. 8 mill. Madagascar. — Voisin de *C. scutellatus* Jac. en diffère par la suture testacée, l'extrémité inférieure de coloration claire, etc.

Cryptocephalus elongaticornis n. sp. Parum elongatus, nitidus, infra sparse pubescens, pallido-testaceus, oculis, antennis apice tarsisque nigris. Antennis longissimis, gracilibus ; thorace breve, antice attenuato, minute punctato, lobo breve subtruncato ; elytris satis elongatis, subparallelis, humeris prominulis, mediocre et sparse lineato-punctatis, intervallis latis ; pedibus elongatis. Long. 4 mill. Tananarive. — Peut se placer près de *C. oblongulus* Frm., pattes plus claires, coloration plus pâle et remarquable par ses antennes qui atteignent presque le sommet des élytres.

Cryptocephalus didyanus n. sp. Satis elongatus, nitidus, infra sparse pubescens, rufo-testaceus, pygidio, abdomine pedibusque pallidioribus, antennis apice late

tarsisque nigris. Antennis elongatis, subfiliformibus ; thorace breve, apice attenuato, postice sinuato, lobo indistincto ; elytris satis elongatis, subparallelis, fortiter striato-punctatis, intervallis convexis. Long. 3 mill. Madagascar : Didy. — Un peu plus allongé que le précédent, moins pâle avec la sculpture des élytres différente et les antennes plus courtes.

Cryptocephalus depressicornis n. sp. Oblongus, parum nitidus, infra sat dense pubescens, niger, pro parte rufo-tinctus (in capite et infra corpore), thorace rufo-testaceo, in disco late nigro bimaculato, scutello rufo-testaceo, elytris pygidioque testaceis ; antennis pedibusque pro majore parte nigris. Antennis ad basin gracilibus, articulis 6 et sequentibus depressis ; thorace breve, antice attenuato, postice sinuato, lobo parum prominulo, subtruncato ; elytris latis et satis brevibus, fortiter striato-punctatis, intervallis subdepressis. Long. 5 mill. Madagascar. — Espèce très distincte de la précédente et des autres voisines par sa structure antennaire jointe à sa coloration.

Cryptocephalus tananarivanus n. sp. Brevis et robustus, nitidus, infra mediocre pubescens, rufo-testaceus, labro, oculis, antennis apice, scutello et infra corpore nigris, pygidio testaceo, nigro maculato ; thorace rufo, in disco nigro bimaculato ; elytris testaceis, ad basin et ad suturam nigro marginatis, ad humeros late et irregulariter nigro maculatis, postice ad suturam vage nigro lineolatis ; elytris minute lineato-punctatis, intervallis latis. Long. 3 mill. — Voisin de *C. suturanigra* Frm., élytres à ponctuation plus fine, à macule humérale plus grosse et irrégulière, bilobée en arrière, etc.

Cryptocephalus discissus v. nov. preapicalis. Elytris nigris, lateraliter antice et ad apicem testaceo notatis, pygidio testaceo, nigro maculato. Madagascar. — La forme type n'a pas de macule postérieure testacée.

Ectenostoma annulipes n. sp. Elongatus, antice et postice parum attenuatus, pubescens, parum nitidus, rufus, capite, antennis pro majore parte, femoribus apice, tarsis pro parte abdomineque plus minusve nigris. Capite satis elongato ; thorace antice attenuato, dense punctato ; elytris elongatis, minute striatis, mediocre punctatis. Long. 7 mill. Dahomey. — Voisin de *P. capitata* Mull. et distinct, à première vue, par les pattes en majeure partie testacées.

Ectenostoma piceitarsis n. sp. Rufus, oculis, antennis pro majore parte, tarsis abdomineque apice nigro-piceis. Long. 6-7 mill. Dahomey. — Forme et faciés du précédent, yeux un peu plus grands, tête rousse et cuisses sans anneau noir au sommet.

Ectenostoma delagoensis n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, parum nitidus et mediocre pubescens, testaceus, oculis, antennis pro parte abdomineque apice nigro-piceis, elytris fere instriatis. Long. 6 mill. Delagoa-Bay. — Plus étroit, plus pâle que le précédent avec les élytres à stries presque nulles, au lieu d'être bien distinctes.

Ectenostoma zanguebarensis n. sp. Modice elongatus, pubescens, nitidus, pallido-testaceus, oculis, tarsis pro parte abdomineque apice nigris. Long. 6 mill. Zanguebar. — Peut se placer près de *S. delagoensis* mihi, distinct, à première vue, par les élytres moins étroits et à stries plus distinctes.

Ectenostoma zanguebarensis v. nov. atripennis. Niger, capite, thorace, antennis pedibusque testaceis. Zanguebar.

Ectenostoma submetallica n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, viridimetallicus, thorace elytrisque rufis, aut thorace aliquot in disco plus minusve viridescente **(v. notatithorax)**, antennis nigris, ad basin

rufo notatis, pedibus testaceis, femoribus apice metallico notatis, tarsis pro parte piceis. Capite elongato ; thorace antice attenuato, minute sat dense punctato ; elytris satis elongatis, distincte striatis, intervallis sat grosse punctatis. Long. 9-11 mill. Erythrée. — Distinct, à première vue, des espèces précédentes par l'écusson foncé et le dessous du corps métallique.

Ectenostoma viridithorax v. nov. Behanzini. Testaceus, capite antice antennis pro majore parte, femoribus apice tarsisque nigris, thorace in disco vage metallico. Long. 9 mill. Dahomey. — Diffère de la forme type par le prothorax en majeure partie testacé et par la tête roussâtre postérieurement.

Psilonycha sibutensis n. sp. Oblongus, elongatus, convexus, minute pubescens, nitidus, testaceus, oculis, antennis pro majore parte, pedibus pro majore parte et infra corpore pro parte nigris. Capite breve ; thorace transverso, postice in medio sulcato, dense rugoso-punctato ; elytris satis latis, apice attenuatis, minute sed distincte striatis, intervallis minute rugoso-punctatis. Long. 9 mill. Fort Sibut. — Très voisin de *P. biimpressa* Pic, mais écusson plus grand, prothorax sans impressions discales et coloration uniforme sur le dessus.

Psilonycha natalensis (Buq.) Subovatus, convexus, minute pubescens, parum nitidus, rufo-testaceus, pedibus, aliquot pallidioribus, abdomineque plus minusve nigro-piceis. Long. 10-10,5 mill. Natal. — Ressemble au précédent par sa couleur et son revêtement pubescent, mais élytres subovalaires et membres plus clairs. A placer près de *P. tenellus* Fahr.

Psilonycha subrufescens n. sp. Oblongo-elongatus, parum convexus, minute pubescens, fere opacus, rufo-testaceus, pedibus pallidioribus, oculis griseis. Thorace transverso, dense punctato ; elytris thorace haud latiori-

bus, subparallelis, apice attenuatis, minute striatis. Long. 9 mill. Natal. — Diffère du précédent par la forme plus parallèle et l'abdomen roux.

Eustrophinus superbus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, sparse pubescens, testaceus, antennis apice scutelloque nigris ; thorace lateraliter nigro marginato et in disco minute nigro quadri maculato, elytris in disco ante et post medium late nigro notatis, his irregulariter et minute punctatis. Long. 9 mill. Colombie : Cauça. — Jolie espèce, très distincte par son dessin élytral fait d'une grande macule noire à contours irréguliers et entamée un peu en avant, puis fortement vers le milieu, par la coloration claire des bords, en outre les épaules ont une petite macule noire isolée et le rebord externe antérieur est foncé.

Eustrophinus 14-maculatus n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, fere glaber, pallido-testaceus, scutello nigro, thorace quadri et elytris quinque nigro maculatis, maculis intermediis subfasciatis, his distincte et irregulariter punctatis, pro parte nigro marginatis. Long. 7 mill. Colombie. — Voisin de *C. 15-maculatus* Cast., mais chaque élytre a une macule de moins sur son milieu et la forme des macules médianes est différente, celles-ci étant transversales.

Eustrophinus lineatopunctatus n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, sat dense fulvo pubescens, rufus, pro parte infra et thorace elytrisque in disco nigro-piceis, antennis nigris, ad basin et apice testaceis ; elytris lineato-punctatis, fere instriatis, intervallis depressis. Long. 8 mill. Brésil. — Voisin de *C. striatus* Seidl., mais élytres à intervalles non convexes, à stries indistinctes avec le dessus du corps en partie obscurci.

Eustrophinus mexicanus n. sp. Subovatus, postice parum attenuatus, nitidus, sat dense fulvo pubescens, rufus, articulis 5-10 antennarum nigris ; elytris minute lineato-

punctatis, intervallis planatis. Long. 7 mill. Mexique. — Moins allongé et de coloration plus claire que le précédent, en outre ponctuation plus faible. Peut se placer près de *E. ovatus* Chp.

Eustrophinus Crampeli n. sp. Angustatus, postice attenuatus, nitidus, pro parte sat dense fulvo pubescens, niger, antennis ad basin tarsisque testaceis, elytris nigris, rufo cinctis, substriato-punctatis, intervallis deplanatis. Long. 11 mill. Congo : Fort Crampel. — Jolie espèce pouvant prendre place près de *E. circumcinctus* Chp., dont elle paraît différer par la forme plus allongée et la coloration testacée plus régulièrement disposée sur le pourtour des élytres qui, en outre, sont étroitement bordés de foncé antérieurement sur leur repli.

Eustrophinus abyssinicus n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, nitidus, sat dense fulvo pubescens, piceus, elytris apice pallidioribus, pedibus pro parte testaceis ; elytris substriato-punctatis, intervallis deplanatis. Long 12 mill. Abyssinie. — A placer près de *C. substriatus* Fairm.

Holostrophus Rouyeri n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, sat dense fulvo pubescens, rufus, antennis ad medium thoraceque in medio late nigris ; elytris nigro-piceis, pro parte rufo cinctis, ad basin rufo fasciatis, in medio ad suturam et postice tranverse testaceo maculatis ; elytris irregulariter punctatis. Long. 5 mill. Java (Rouyer). — Voisin de *H. borneensis* Pic avec les dessins des élytres différents.

Holostrophus multinotatus v. nov. tonkineus. Macula media rufa elytrorum obliterata. Tonkin. — Distinct de la forme type par ses élytres n'ayant pas de macule médiane rousse prescutellaire.

Phlœotrya guyanensis n. sp. Elongatus, parum nitidus, pubescens, dense punctatus, rufo-brunnescens, an-

tennis pedibusque testaceis. Long. 12 mill. Guyane Française. — Ressemble à *P. rugicollis* Mars., mais prothorax dépourvu de rugosités, élytres plus atténués à l'extrémité, etc.

Phlœotrya brasiliensis n. sp. Elongatus, subopacus, pubescens, dense punctatus, rufescens, pro parte brunneus, antennis pedibusque testaceis, thorace lateraliter et postice depresso. Long. 8 mill. Brésil. — Ressemble à *P. mexicana* Chp. et distinct, à première vue, par la taille moindre.

Borneocamaria n. gen. Prosterno lato ; epipleuris antice latis, postice attenuatis ; articulis 6 ultimis antennarum dilatatis et subopacis ; capite libero ; oculis magnis, valde transversis ; thorace sinuato, antice valde lunato ; elytris subelongatis, antice oblique attenuatis, apice subacuminatis, lateraliter attenuatis. — Ce nouveau genre se rapproche de *Agræcus* Fairm., mais les yeux sont moins écartés entre eux, le prothorax est plus fortement échancré en avant, les antennes n'ont pas leur 6e article allongé, etc.

Borneocamaria atra n. sp. Oblongo-elongatus, glaber, parum nitidus, niger, capite thoraceque mediocre pro parte sparse punctatis ; elytris thorace latioribus, ad humeros antice oblique attenuatis, postice breve et valde attenuatis, striatis, intervallis subconvexis. Long. 33-35 mill. Bornéo.

Drocleana tuberculata n. sp. Elongatus, nigro-subæneus et subopacus, elytris metallicis, æneo-viridescentibus, antennis pedibusque rufo-piceis. Thorace breve, lateraliter fere recto ; elytris striatis, ante apicem fortiter tuberculatis. Long. 30 mill. Madagascar : Fenerive. — Espèce très distincte par la présence, sur chaque élytre, d'un tubercule un peu allongé, excavé en dedans et placé très près de l'extrémité ; peut se placer près de *D. chalcoptera* Klug.

Camaria inlimbata n. sp. Oblongus, convexus, parum nitidus, viridi-metallicus, pro parte purpureo tinctus, elytris viridibus, rubro-costatis, pedibus viridibus, femoribus pro parte ante apicem purpureis, infra corpore sparse argenteo piloso. Long. 25 mill. Tonkin : Chapa (ex Vitalis). — Très voisin par sa forme et sculpture de *C. regia* Frm., en diffère, à première vue, par les cuisses non tachées de bleu au sommet et par les élytres dépourvus de bordure latérale pourprée.

Camaria distinctestriata n. sp. Elongatus, postice parum dilatatus et apice breve attenuatus, nitidus, nigro-æneus, pro parte viridescens, elytris minute stratis, striis subauratis, apice et lateraliter purpureo cinctis ; infra corpore pedibusque pro parte viridescentibus, pro parte cupreo-purpureis. Long. 32 mill. Chapa (ex Vitalis). — Voisin de *C. microdera* Frm., coloration un peu différente, élytres à stries un peu dorées au lieu d'être bleues, suture non pourprée, etc.

Lyprops pilosus v. nov. semirufus Pic. Latus, fulvo hirsutus, niger, elytris rufescentibus. Zanguebar.

Lyprops Crampeli n. sp. Oblongus, parum elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, fortiter et parum dense punctatus, niger, femoribus pro parte elytrisque rufescentibus. Antennis brevibus, apice dilatatis ; thorace breve, lateraliter subarcuato ; elytris latis, parum elongatis, apice breve attenuatis, irregulariter et dense punctatis. Long. 7 mill. Congo : Fort Crampel. — Peut se placer près de *L. breviusculus* Gerst. dont il se distingue, à première vue, par la forme plus allongée.

Lyprops Bruyanti (1) n. sp. Oblongus, parum elongatus, nitidus, sparse griseo pubescens, fortiter sat dense punctatus, nitidus, niger aut nigro-piceus, elytris brun-

(1) Cette espèce et les suivantes sont nommées pour honorer la mémoire de divers collègues morts au Champ d'honneur.

nescentibus aliquot thorace capiteque plus minusve brunnescentibus **var. nov. diversicolor**). Antennis brevibus, apice dilatatis ; thorace breve, lateraliter subrotundato ; elytris latis, parum elongatis, apice breve attenuatis, irregulariter et dense punctatis. Long. 7-8 mill. Sierra Leone. — Diffère du précédent par le prothorax plus arrondi sur les côtés et la coloration plus claire des élytres.

Lyprops Vuilleti n. sp. Oblongus, parum elongatus, nitidus, luteo pubescens, sat fortiter et pro parte sparse punctatus, niger. Antennis brevibus, satis validis ; thorace breve, lateraliter subrotundato ; elytris latis, postice minute dilatatis et apice breve attenuatis. Long. 8 mill. Assinie. — Très voisin du précédent, élytres un peu plus larges et noirs.

Lyprops Chatanayi n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, fulvo hirsutus, fortiter sat sparse punctatus, niger, aliquot pro parte piceus. Antennis satis brevibus, apice dilatatis ; thorace breve, lateraliter subarcuato, postice distincte attenuato ; elytris latis, brevibus, apice attenuatis. Long. 7 mill. Afrique : Beira. — Très distinct, à première vue, des précédents par la pubescence redressée, ce qui la rapproche de *L. pilosus* Mull., mais ce dernier est plus trapu.

Lyprops Buffeventi n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, fulvo pubescens et pro parte hirsuto pilosus, fortiter sat sparse punctatus, nigro-piceus. Antennis satis brevibus, apice dilatatis ; thorace breve, antice lateraliter subarcuato ; elytris latis et brevibus, apice breve attenuatis. Long: 7 mill. Gabon : Bénito. — Plus robuste que le précédent avec la pubescence moins redressée.

Anædus impressicollis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, fere glaber, niger, tibiis apice tarsisque rufis. Oculis distantibus ; capite antice transverse sulcato ; antennis satis brevibus, apice paulum crassioribus ; thorace

breve, ad medium rotundato-arcuato, angulis posticis rectis, fortiter et dense punctato ; elytris thorace valde latioribus, subparallelis, apice minute attenuatis, mediocre et dense, pro parte regulariter, punctatis. Long. 8 mill. Mexico. — Voisin de *A. corvinus* Boh. et distinct, à première vue, par la ponctuation plus dense des élytres et par les tarses roux.

Anædus rufitarsis n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, parum pubescens, niger, tarsis rufis. Long. 10 mill. Vénézuela : Caracas. — Très voisin du précédent, mais prothorax plus fortement rétréci vers les angles postérieurs et à ponctuation moins large, élytres à ponctuation moins régulièrement disposée.

Anædus nitidissimus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidissimus, minute et sparse pilosus, niger, tarsis rufis. Long. 9 mill. Costa Rica (P. Biollay). — Diffère à première vue, du précédent par l'aspect très brillant ; en outre, le prothorax est moins transversal.

Anædus abyssinicus n. sp. Oblongo-angustatus, nitidus, parum pubescens, niger. Capite antice sulcato, oculis paulum distantibus : antennis satis elongatis ; thorace breve, lateraliter subarcuato et deplanato, mediocre et dense punctato, angulis posticis prominulis ; elytris thorace paulum latioribus, apice attenuatis, minute sat dense punctatis. Long. 7 mill. Abyssinie. — De forme plus allongée que le précédent avec la coloration des pattes différente, etc.

Anædus explanatus. Subdepressus, oblongus, nitidus, brunneus, thorace lateraliter, antennis ad basin pedibusque pallidioribus. Thorace lateraliter subarcuato, valde explanato. Long. 7 mill. Gabon : Ogoué. — Diffère du précédent, en outre de la coloration plus claire, par le prothorax plus régulièrement arrondi latéralement et plus nettement explané.

Anædus rufocinctus n. sp. Oblongus, postice attenuatus, nitidus, fere glaber, niger, tarsis rufis, elytris nigris, lateraliter irregulariter et postice latiore rufo cinctis. Long. 12 mill. Pérou. Cette jolie espèce, très distincte par la coloration rousse irrégulièrement étendue sur le pourtour des élytres, peut se placer près de *A. posticalis* Frm.

Anædus rufipes n. sp. Parallelus, nitidus, dense et pro parte fulvo hirsutus, dense punctatus, niger, antennis ad basin, palpis, pedibus abdomineque apice rufis. Antennis validis et brevibus ; thorace lateraliter biangulato, postice parum attenuato ; elytris thorace parum latioribus, antice lateraliter subcrenulatis. Long. 9 mill. Kina Balu. — Espèce très distincte par sa pubescence redressée, ses pattes rousses et robustes, etc.

Anædus rufescens n. sp. Oblongus, satis latus, nitidus, fere glaber, rufescens, capite pro parte et thorace in disco obscurioribus, antennis piceis, ad basin rufis. Capite satis lato, antice subsulcato, oculis distantibus ; antennis gracilibus ; thorace breve, valde tranverso, lateraliter ad medium subangulato-rotundato, postice parum attenuato, fortiter et dense punctato ; elytris satis latis, subparellelis, apice attenuatis, mediocre et parum dense punctatis. Long. 11 mill. Colombie. — Distinct de *A rufitarsis* mihi et voisins par sa coloration en majeure partie roussâtre.

Anædus geniculatus n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, longe griseo pilosus, niger, elytris pro parte picescentibus, capite antice, antennis ad basin, geniculis, tibiis pro parte tarsisque rufis. Capite antice sulcato ; antennis validis ; thorace breve, ad medium lateraliter subangulato, fortiter sat sparse punctato ; elytris thorace paulum latioribus, subparallelis, apice breve attenuatis, minute et dense punctatis. Long 7 mill. Colombie (F. Claver). — Espèce très distincte par la coloration de ses pattes,

jointe à la ponctuation élytrale relativement petite et dense. Peut se placer près de *A. villosus* Chp.

Anædus silphoides n. sp. Depressus, subovatus, postice attenuatus, nitidus, lateraliter minute marginato, niger, articulo 1° antennarum apice et secundo tarsisque rufis. Long. 9 mill. Congo : Ogoué. — Espèce remarquable par sa forme silphoide. Peut se placer près de *A. expansicollis* Geb.

Anædus diversithorax n. sp. Subdepressus, oblongus, antice et postice attenuatus, nitidus, niger, antennis ad basin pro parte, tibiis plus minusve tarsisque rufescentibus. Thorace postice late explanato, antice attenuato. Long. 7 mill. Ogoué. — Très distinct du précédent par sa forme générale et par son prothorax largement explané, et un peu relevé, postérieurement.

Basanædus dentatus n. sp. Oblongo-ovatus, nitidus, niger, capite, thorace, articulis primis antennarum, femoribus ad basin, scutello et infra corpore rufo-testaceis, elytris antice et postice luteo fasciatis ; femoribus intermediis et posticis valde dentatis. Long. 8 mill. Gabon. — Ressemble à *B. fascialus* Pic, élytres moins étroits, coloration de l'avant-corps plus caire, première fascie plus large, etc.

Aspisoma (1) **guyanensis** n. sp. Ovatus, postice valde attenuatus, nitidus, luteo pilosus, rufus, antennis nigris, ad basin breve rufescentibus. Long. 6 mill. Guyane Française. — Très distinct de *A. ovata* Frm. (ex description), en outre de la coloration, par la ponctuation irrégulière des élytres et le prothorax non angulé latéralement.

Aspisoma diversicollis n. sp. Subovatus, postice distincte attenuatus, nitidus, luteo sat longe pilosus, rufus,

(1) Dans ce genre méconnu rentrent certains anciens *Anœdus* Blanch.

antennis, articulis, primis exceptis, capite thoraceque in disco late piceis. Oculis parum distantibus, capite antice sulcato, antennis satis validis ; thorace breve, lateraliter sinuato, fortiter sat dense punctato ; elytris subovatis, apice attenuatis, humeris rotundatis, parum dense pro parte ruguloso punctatis. Long. 5 mill. Guyane Française. — Plus petit que le précédent, élytres de forme plus allongée, prothorax en partie foncé et autrement ponctué.

Aspisoma rufipennis n. sp. Ovatus, nitidus, fere glaber, nigro-piceus, antennis ad basin, scutello, elytris abdomineque rufo-testaceis. Oculis distantibus ; capite antice transverse depresso ; thorace breve, lateraliter subrotundato-arcuato, fortiter, in disco sparse, lateraliter sat dense punctato, angulis posticis prominulis ; elytris satis latis, humeris prominulis, apice attenuatis, sat fortiter et sparse punctatis. Long. 7 mil.. Brésil : Espirito Santo. — Paraît devoir se placer près de *ovata* Frm. (*Anædus*) qui ne m'est connu que par la description.

Aspisoma mendesensis n. sp. Ovatus, nitidus, fere glaber, nigro-piceus, antennis ad basin pedibusque brunnescentibus, elytris rufis. Long. 7 mill. Brésil : Mendès. — Très voisin du précédent, coloration du dessous et des pattes différente, prothorax à ponctuation moins dispersée sur le disque, élytres à ponctuation plus marquée.

Aspisoma forticornis n. sp. Ovatus, nitidus, distincte et longe griseo pubescens, niger, antennis ad basin, elytris, abdomine apice pedibusque rufis. Oculis distantibus ; capite antice sulcato ; antennis validis ; thorace breve, lateraliter antice subarcuato, fortiter, in disco sparse, punctato, angulis posticis rectis ; elytris satis latis, apice attenuatis, humeris satis prominulis, mediocre et sparse, pro parte, granulato-punctatis. Long. 5 mill. Amazones. — Très distinct des précédents par les antennes plus fortes, les élytres moins larges à la base par rapport au prothorax, etc.

Aspisoma minuta n. sp. Ovatus, nitidus, distincte sat longe griseo pubescens, nigro-piceus, antennis ad basin, scutello, elytris, infra corpore pedibusque rufescentibus. Long. 5 mill. Amazones. — Très voisin du précédent, antennes moins fortes, prothorax moins foncé, etc.

Aspisoma inhumeralis n. sp. Ovatus, postice valde attenuatus, nitidus, luteo pilosus, rufus, antennis apice late nigris. Oculis satis distantibus ; capite breve, antice impresso ; thorace breve, antice valde attenuato, postice lateraliter oblique truncato, late sat sparse punctato ; elytris satis latis, apice valde attenuatis, humeris rotundatis, ruguloso, pro parte dense, punctatis. Long. 7 mill. Amazones. — Distinct des précédents, et à première vue, par les élytres très arrondis aux épaules et par le prothorax de nuance plus claire.

Pseudolyprops testaceipes n. sp. Ovatus, nitidus, rufus, pedibus pallidioribus. Oculis satis approximatis ; capite antice late impresso ; thorace breve, lateraliter subarcuato et mediocre unidentato, late punctato ; elytris, subovatis, apice attenuatis, sat fortiter et dense punctatis. Long. 4,5 mill. Sumatra. — Diffère de *P. Beloni* Frm., par les antennes moins claires, le prothorax différent, moins rétréci en arrière, etc.

Pseudolyprops sumatrensis n. sp. Ovatus, nitidus, rufus, antennis pedibusque pallidioribus. Oculis distantibus ; capite antice transverse sulcato ; thorace breve, lateraliter mediocre bidentato, sat fortiter punctato ; elytris subovatis, apice attenuatis, fortiter punctatis. Long. 4-4,5 mill. Sumatra. — Diffère du précédent, en outre de la structure du prothorax, par cet organe moins largement ponctué.

TABLE

POUR LE VINGT-QUATRIÈME FASCICULE

Pages.

Introduction 1

Descriptions abrégées diverses 2